

Akodon paranaensis Christoff *et al.* (2000)

Cariótipo em Banda G disponível em Hass *et al.* (2008)

2n	NF	Cromossomo X	Localidade	Coordenadas
44	42	Acrocêntrico grande	Três Barras, Curitiba-PR (Brasil)	25°26'S, 48°53'W; 25°22'S, 49°13'W

Referência

Hass, I.; Sbalqueiro, I.J.; Müller, S. 2008. **Chromosomal phylogeny of four Akodontini species (Rodentia, Cricetidae) from Southern Brazil established by Zoo-FISH using *Mus musculus* (Muridae) painting probes.** Chromosome Research 16:75–88.


Link

http://www.academia.edu/6394508/Chromosomal_phylogeny_of_four_Akodontini_species_Rodentia_Cricetidae_from_Southern_Brazil_established_by_Zoo-FISH_using_Mus_musculus_Muridae_painting_probes

Cariótipo modificado de Bonvicino *et al.* (2011)

2n	NF	Cromossomo X	Cromossomo Y	Localidade
44	44	Acrocêntrico médio	Acrocêntrico pequeno	Joborá – SC (Brasil)

Coloração comum



Referência

Bonvicino, C. R. 2011. **Diversidade cariotípica em roedores Akodontini do Brasil**. *Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia*, n° 62, 7-13 pp. ISSN 1808-0413.

Link

<https://archive.org/details/201112ISSN18080413BSBMz62>